

Instrucciones para Colonoscopia

Dirección: 2 BENNETT AVENUE 2DO PISO NEW YORK, NY 10033 (GPDDC)

➤ **PARE ANTICOAGULANTES COMO COUMADIN (WARFARIN), PLAVIX (CLOPIDOGREL), AGGRENOX, ELIQUIS, BRILINTA, TICLID, XARELTO, PRADAXA COMO LO INDICÓ EL DOCTOR.**

➤ **Si usted toma medicamentos como Wegovy, Ozempic, Trulicity, Mounjaro, Saxenda, Victoza, Rybelsus y Byetta.**

Estos medicamentos se recetan ampliamente para tratar la diabetes y promover pérdida de peso. Estos medicamentos disminuyen el vaciado gástrico y los alimentos pueden permanecer en el estómago por más tiempo que alguien que no los toma. Esto puede aumentar el riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar (el contenido del estómago termina en los pulmones) durante el procedimiento. Los pacientes deberán suspender estos medicamentos durante dos dosis antes del procedimiento. Consulte a su PCP o al médico que lo receta para determinar si es seguro dejar de tomar estos medicamentos durante este período.

Si está usando estos medicamentos semanalmente pare 1 semana antes. (2 dosis)

Si usa estos medicamentos diarios pare 3 días antes.

➤ **El día del procedimiento puede continuar la medicina de la presión y aspirina; si toma medicinas para la diabetes no tomar a menos que el medico lo autorice.**

DEBE DE TENER A UN ADULTO QUE LO PASE A RECOGER DESPUES DEL PROCEDIMIENTO; DE NO TENER ALGUIEN ASIGNADO SU PROCEDIMIENTO NO SERÁ REALIZADO.

Busque en la farmacia: Dulcolax (Bisacodyl) 5mg (3 tres tabletas) , Nulytely, Golytely, Trilytely (un gallon)

EL DIA ANTES DE SU COLONOSCOPIA

- **NO CONSUMIR COMIDAS SÓLIDAS, EVITAR LA LECHE Y LÍQUIDOS ROJOS**
- Puede comer algo ligero antes de las 8:00 am. Algo ligero puede ser una rodaja de pan blanco sin las orillas con café negro o te, galletas de soda, o una taza de arroz blanco. Después de este desayuno ligero llevar dieta líquida.
- Estos líquidos pueden ser: **Caldo de sopa (pollo o res), jugo de manzana o limón, agua de coco (sin pulpa), Seven up, Sprite, Ginger Ale, Crystal lite, agua seltzer, Gelatinas (amarilla o naranja), gatorade (limón o naranja), café, agua o té.**
- **5:00 PM:** Tomar las 3 pastillas de **Dulcolax (bisacodyl)** con un vaso de agua.
- **6:00 PM:** Prepare el galón del purgante con **agua o jugo de manzana**, y empiece a beber un vaso de 10 a 15 minutos hasta que llegue a la mitad del galón. Guarde la mitad restante en el refrigerador. Puede continuar su dieta líquida.

EL DIA DE LA COLONOSCOPIA

- Debe de tomar la segunda mitad del galón a las _____ (4 horas antes de su procedimiento), después de haberse tomado el purgante no puede ingerir más líquidos.

DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO

- **Debe informar a su médico si presenta fiebre de más de 100 grados, mucho dolor abdominal o sangrado rectal. Llame al 911 o a la oficina 212-795-1021**