

Lincoln Hernandez, MD.

Tel: 212-795-1021

Dirección: 2 BENNETT AVENUE 2DO PISO NEW YORK, NY 10033 (GPDDC)

➤ **PARE ANTICOAGULANTES COMO COUMADIN (WARFARIN), PLAVIX (CLOPIDOGREL), AGGRENOX, ELIQUIS, BRILINTA, TICLID, XARELTO, PRADAXA COMO LO INDICÓ EL DOCTOR.**

➤ **Si usted toma medicamentos como Wegovy, Ozempic, Trulicity, Mounjaro, Saxenda, Victoza, Rybelsus y Bvetta.**

Estos medicamentos se recetan ampliamente para tratar la diabetes y promover pérdida de peso. Estos medicamentos disminuyen el vaciado gástrico y los alimentos pueden permanecer en el estómago por más tiempo que alguien que no los toma. Esto puede aumentar el riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar (el contenido del estómago termina en los pulmones) durante el procedimiento. Los pacientes deberán suspender estos medicamentos durante dos dosis antes del procedimiento. Consulte a su PCP o al médico que lo receta para determinar si es seguro dejar de tomar estos medicamentos durante este período.

Si está usando estos medicamentos semanalmente pare 1 semana antes. (2 dosis)

Si usa estos medicamentos diarios pare 3 días antes.

➤ **El día del procedimiento puede continuar la medicina de la presión y aspirina; si toma medicinas para la diabetes no tomar a menos que el medico lo autorice.**

DEBE DE TENER A UN ADULTO QUE LO PASE A RECOGER DESPUES DEL PROCEDIMIENTO; DE NO TENER ALGUIEN ASIGNADO SU PROCEDIMIENTO NO SERÁ REALIZADO.

- ✓ **Puede comer regular el dia antes de su endoscopia hasta la media noche.**
- ✓ **El día del procedimiento por favor evitar comida sólida, leche y líquidos con color rojo.**

Puede tener una dieta de líquidos claros hasta **4 horas antes** de su procedimiento; estos líquidos pueden ser:

- **Caldos de sopa (pollo o res)**
- **Jugo de manzana o de limon**
- **Gatorade (Limon o Naranja)**
- **Agua de coco sin la pulpa**
- **Agua, Café, Te**
- **Gelatinas (amarilla o naranja)**
- **Seven Up, Sprite, Ginger ale, Agua Seltzer.**

DESPUES DE SU PROCEDIMIENTO

- **Debe informar a su medico si presenta fiebre más de 100 grados, mucho dolor abdominal o sangrado; llame al 911 o al 212-795-1021.**